


Legenda pittogrammi

Quando utilizzare il prodotto:



Prima della semina o del trapianto




In fase di radicazione



In fase di sviluppo vegetativo



Al momento della fioritura



Al momento dell'invasiatura



In fase di maturazione



In post raccolta



In caso di colture in stato di stress causato da agenti biotici (attacchi parassitari o di patogeni) e/o abiotici (stress idrico, termico, carenze nutrizionali)



Amnesso in agricoltura biologica

Come utilizzare il prodotto:



Applicazione fogliare



Fertirrigazione



A spaglio o localizzato

Formati disponibili:



Taniche da 10 kg



Taniche da 25 kg




Sacchi da 5 kg



Sacchi da 25 kg



Secchi da 20 kg



Big bags da 600 kg



IBC da 1250 kg

Pictogram legend

When to use our products:



Before or during sowing




Rooting



Vegetative stage



Flowering



Veraison



Ripening



Post harvest



In case of stress conditions caused by biotic agents (parasitic or pathogenic attacks)
and / or abiotic (water and heat stress, nutritional deficiencies)



Admitted in organic farming

How to use our products:



Foliar application



Fertigation



Broadcast or localized sowing

Packages:



Jerry can 10 kg



Jerry can 25 kg




Bag 5 kg



Bag 25 kg



Bucket 20 kg



Big bags 600 kg



IBC 1250 kg

Pictogramme Légende

Quand utiliser nos produits :



Avant ou pendant semis




Enracinement



Phase végétatif



Floraison



Véraison



Maturité



Après la récolte



Conditions de stress causées par des agents biotiques (parasites ou pathogènes attaques)
et/ou abiotique (stress hydrique et thermique , carences)



Admis en agriculture biologique


Comment utiliser nos produits :



Application foliaire



Fertirrigation



Diffusé ou localisé semis

Paquets:



Char de 10 kg



Char de 25 kg




Sac de 5 kg



Sac 25 de kg



Seau de 20 kg



Big bag 600 kg



IBC 1250 kg